

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
 Краевая клиническая больница
 ул. П. Железняк, 3, г. Красноярск, 660022
 Телефон: 8 (391) 220-16-13
 Факс: 8 (391) 220-16-23
 E-mail: kkb@medqorod.ru
 Http://www.kkb1.kkb1.krasu.ru
 ОКПО 01913234
 ИНН/КПП 2465030876/246501001

Руководителю организации

12.10. 2017 г. № 293-2017
 На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемый руководитель!

Администрация краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница» просит предоставить коммерческое предложение с указанием цены на следующий товар:

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики	Ед.из	Кол-во	Цена	Производитель
1	Дигидротахистерол	р-р. 1 мг/мл - 15 мл / фл.	уп	30		
2	Такролимус	капс. пролонг. 0,5 мг №50	уп	12		
3	Такролимус	капс. пролонг. 1,0 мг №50	уп	100		
4	Альбумин	р-р для инф. 20%-100 мл	уп	110		
5	Альбумин	р-р. для инф. 10% - 100 мл	уп	12		
6	Альфакальцидол	капс. 0.25 мкг № 60	уп	10		
7	Альфакальцидол	капс. 0.5 мкг № 60	уп	30		
8	Дарбэпоэтин альфа	р-р д/ин. 30мкг. 0,3мл.шпр № 1	уп	45		
9	Энтекавир	табл. п.п.о., 0,5 мг №30	уп	2		
10	Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол+Триме топрим]	табл. 480 мг №20	уп	39		
11	Алпростадил	60мкг лиоф. пригот. р-ра д/инф. №10	уп	20		
12	Валганцикловир	табл. п.п.о. 450 мг №60	уп	32		
13	Железа [III] гидроксид сахарозный комплекс	р-р для в/в введения 20мг/мл 5мл №5	уп	15		
14	Орнитин	конц. д/инфузий 5 г - 10 мл N10 амп.	уп	2		
15	Адеметионин	пор. д/ин. 400 мг / N.5	уп	15		
16	Дифенгидрамин	р-р 1% амп. 1мл № 10	уп	150		
17	Линезолид	р-р д/инф. 2 мг/мл-300мл N10	уп	8		
18	Клопидогрел	таб. п/о 75мг №84	уп	18		
19	Цефуроксим	порошок 1.5 г N1 флаконы	уп	50		
20	Симвастатин	таб.п.п.о. 20мг №28	уп	90		
21	Фибриноген человеческий/тромбин человеческий	набор р-ров д/клея хирург. фл. стекл., 2 мл+2мл	уп	40		
22	Эптифибатид	р-р для в/в введ-я 0,75 мг/мл - 100 мл	уп	45		
23	Эптифибатид	р-р для в/в введ-я 2 мг/мл - 10 мл	уп	45		
24	Кальция карбонат+ Колекальциферол	таб. 0.5 N100	уп	30		
25	Кальция глюконат	р-р д/ин. 100мг/мл амп. 10мл №10	уп	200		
26	Эноксапарин натрий	р-р для п/к введ. 4000 анти-ХА МЕ/0,4мл, с устр. д/защит. игл x 10 шпр.	уп	440		

27	Биспролол	таб. 5 мг N50	уп	20		
28	Даптомидин	лиоф.пор.д/приг.р-ра д/инф. 500 мг N1 фл.	уп	28		
29	Кустодиол	р-р для в/коронарн. введ. пак. ПЭ, 1000 мл № 1	уп	800		
30	Левифлоксацин	р-р д/инф 5% 100мл № 1	уп	2 260		
31	Левифлоксацин	таб. 500 мг / №5	уп	870		
32	Лозартан	таб.п/о 50 мг №30	уп	90		
33	Микофеноловая кислота	таб. п/о раствор./кишечн. 180мг. №100	уп	10		
34	Микофеноловая кислота	табл. п.о. раствор./кишечн. 360 мг №120,	уп	42		
35	Мелоксикам	таб. 15 мг N20	уп	150		
36	Меропенем	пор.д/р-ра в/в 500 мг №10 фл.	уп	7		
37	Меропенем	пор.д/р-ра в/в 1 г №10 фл.	уп	80		
38	Метилпреднизолон	лиоф.пор. д/приг ин/р-ра 250 мг N1	уп	30		
39	Метилпреднизолон	табл. 0,004 мг №30	уп	16		
40	Толперизон+Лидокаин	р-р д/ин. 10% - 1 мл N5 ампулы	уп	150		
41	Микафунгин	лиоф.д/приг.р-ра д/инф.100мг/фл № 1	уп	20		
42	Эпоэтин бета	р-р для в/в и п/к введ., 50 мкг, с игл. стер., шпр.-тюб., 0,3 мл № 1	уп	2		
43	Этилметилгидроксипириди на сукцинат	р-р для в/в и в/м введ. 50 мг/мл 2мл № 10	уп	100		
44	Эзомеразол	лиоф. д/р-ра в/в 40 мг N10	уп	29		
45	Нистатин	табл. п.о., 500 000 ЕД, уп. № 100	уп	180		
46	Иммуноглобулин человека нормальный	р-р д/инф. 50мг/мл 100мл	уп	20		
47	Парацетамол	р-р д/инф. 10 мг/мл-100 мл №12	уп	300		
48	Такролимус	капс. 0,5мг №50	уп	18		
49	Такролимус	капс. 1 мг №50	уп	115		
50	Протамина сульфат	р-р 1% - 5 мл / N5 амп.	уп	240		
51	Факторы свертывания крови II, VII, IX и X в комбинации [Протромбиновый комплекс]	лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения № 1	уп	56		
52	Эпоэтин бета	р-р для в/в и п/к введ. 2000 МЕ, шпр.-тюб., 0,3 мл, с игл.№6	уп	30		
53	Терлипрессин	р-р д/ин. 100 мкг/мл, амп., 10 мл №5	уп	10		
54	Левосимендан	конц. для приг р-ра для инф 2,5 мг/мл - фл. 5 мл	уп	12		
55	Базиликсимаб	лиоф. д/р-ра для в/в введ. 20 мг, № 1	уп	30		
56	Йопамидол	р-р для в/в и в/а введ.370мг йода/мл фл.50мл.	уп	4 500		
57	Метилпреднизолон	лиоф.пор. д/приг ин/р-ра 250 мг N1	уп	100		
58	Калия хлорид+Кальция хлорид+Магния хлорид+Натрия ацетат+Натрия хлорид+яблочная кислота	р-р д/инф. 1000мл №10	уп	40		
59	Калия хлорид+Кальция хлорид+Магния хлорид+Натрия ацетат+Натрия хлорид+яблочная кислота	р-р д/инф. 500мл №10	уп	190		
60	Фибриноген+тромбин	губка 9,5x4,8x0,5см	уп	69		
61	Фибриноген+тромбин	губка, 4,8x4,8x0,5 см № 2	уп	53		

62	Пиперациллин+ [Тазобактам]	пор. для приг р-ра для в/в 4г+0,5г №12 фл.	уп	3		
63	Имипенем+[Циластатин]	пор. д/пригот. р-ра д/инф. 500мг+ 500мг 20мл №10,	уп	76		
64	Иммуноглобулин антигитотитарный	лиоф. д/р-ра д/инф. 25 мг, фл., пач. картон. 1,	уп	20		
65	Транексамовая кислота	р-р для в/в введ 50 мг/мл -5 мл № 10	уп	320		
66	Пентоксифиллин	таб. 0.4 г N60	уп	10		
67	Фосфомицин	пор.д/р-ра в/в фл 2 г № 1	уп	100		
68	Урсодезоксихолевая кислота	капсулы 0.25 г / N100	уп	20		
69	Моксонидин	таб.покр.обол. 0,4мг N14	уп	9		
70	Флуконазол	капс. 50 мг № 7	уп	3		
71	Фолиевая кислота	табл. 1 мг № 50	уп	36		
72	Надропарин кальция	р-р для ин-ций 9,5 тыс. анти-Ха МЕ/мл 0,6 мл N10	уп	116		
73	Надропарин кальция	р-р для ин-ций 9,5 тыс. анти-Ха МЕ/мл/0,3мл N10	уп	280		
74	Фуразидин	капс. 50 мг № 30	уп	60		
75	Хлоропирамин	р-р для в/в и в/м введ. 20 мг/мл 1 мл № 5	уп	150		
76	Цитиколин	р-р для в/в и в/м введ. 1000 мг 4мл N5	уп	200		
77	Цефоперазон+ [Сульбактам]	пор. д/р-ра для в/в и в/м введ. 1 г + 1 г, фл., № 1	уп	1 250		
78	Ганцикловир	лиоф. д/р-ра д/инф - 0.5 г N1 фл.	уп	14		
79	Система для нанес. хирург.клея Ивисел, 2-х камерн апплик.	Двухкамерный аппликатор для нанесения хирургического двухкомпонентного фибринового клея Ивисел, предназначенного для остановки кровотечения, склеивания, фиксации и ускорения заживления ран, включает: два объединенных шприца, объемом не менее 2 мл каждый; два приемника для 1 и 2 мл флаконов с растворами, соединённые с каждой камерой аппликатора посредством канюли; две чашечки для захвата 1 и 2 мл флаконов с целью обеспечения стерильности; один универсальный пневматический мягкий трехканальный наконечник длиной не менее 6 см для раздельной подачи фибриногена и тромбина и смешивания компонентов - непосредственно на кончике канюли с целью исключения закупорки, а также возможности подключения подачи воздуха; гибкую прозрачную трубку с фильтром длиной не менее 250 см для присоединения трёхканального наконечника аппликатора к источнику воздуха. При необходимости нанесения хирургического клея на большую зону, может быть применен режим распыления препарата посредством подключения данного аппликатора к магистральному воздуховоду в операционной с использованием регулятора давления (в комплект не входит). Условия хранения: 3 года при комнатной температуре.	шт	40		

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.

Срок поставки: с момента заключения контракта по 31.12.2018г.

Информацию необходимо направить по факсу (391) 220-15-18, по электронной почте: sobolevskaya@medgorod.ru, apteka@medgorod.ru и по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б.

Руководитель контрактной службы

И.О. Куликова

Исполнитель: Попова Е.В. И.О.зав. аптекой, тел. 220-15-18
Адрес электронного документа: Канцелярия\Исх.док\Аптека\